

برآورد ارزش در معرض خطر با درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان

*۲ رسول سجاد^۱، مهسا گرجی^۲

۱. استادیار مهندسی مالی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، rsajja@essex.ac.uk

۲. کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه رجا، قزوین، ایران، m.gorji@hotmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۲/۱۷، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی اثر درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان بر برآورد ارزش در معرض خطر (VaR) برای موقعیت‌های خرید و فروش با استفاده از مدل HYAPARCH و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد به کارگیری مدل‌ها با توزیع‌های شرطی با چولگی و درجه آزادی متغیر یا ثابت در مقایسه با توزیع نرمال توانسته است عدم تقارن داده‌ها را به گونه‌ای مناسب در نظر بگیرد. با وجود این، برآوردهای VaR این مدل‌ها محافظه‌کارانه و برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز مناسب است.

طبقه‌بندی JEL: C13, G32

واژه‌های کلیدی: ارزش در معرض خطر، چولگی و کشیدگی متغیر با زمان، عدم تقارن، مدل

.HYAPARCH

مقدمه

توسعه بازارهای مالی و افزایش مقدار معاملات و افزایش مقدار بالقوه ریسک اهمیت اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار را به وسیله معیار شناخته شده اندازه‌گیری ریسک ^۱ آشکار ساخته است. تحلیلگران مالی و مؤسسه‌سازان به صورت متداول این معیار را برای اندازه‌گیری ریسک بازار به کار می‌برند. این معیار حداقل کاهش ارزش (زیان) یک سید از دارایی‌های مالی را با احتمال مشخص (α-1) و در یک افق زمانی ^۲ معین (h) مشخص می‌کند. در اغلب مطالعات انجام‌شده در زمینه برآورد VaR کانون تمرکز بر گشتاورهای اول و دوم (میانگین و واریانس) بوده است. این در حالی است که پیشرفت‌های اخیر در زمینه قیمت‌گذاری اختیار معامله، انتخاب پرتفو و قیمت‌گذاری دارایی اهمیت در نظر گرفتن چولگی و کشیدگی را بیشتر نمایان ساخته است (کروس و لیتزنبرگ ^۳، ۱۹۷۶؛ هاروی و سیدیکیو ^۴، ۲۰۰۰؛ اسمیس ^۵، ۲۰۰۳؛ فنگ و لای ^۶، ۱۹۹۷، هستون و ناندی ^۷، ۲۰۰۰؛ باتس ^۸، ۱۹۹۶). از این رو، در تحقیق حاضر به مطالعه اهمیت متغیربودن چولگی و کشیدگی در برآورد VaR برای دنباله‌های چپ و راست (مربوط به موقعیت‌های فروش) با در نظر گرفتن حافظه بلندمدت در نوسان پذیری و عدم تقارن برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) پرداخته شده است. بنابراین، مطالعه حاضر از سه جنبه مهم نوآورانه برخوردار است: ۱. بررسی آثار چولگی و کشیدگی متغیر در برآورد VaR؛ ۲. در نظر گرفتن مدل تعمیم‌یافته HYAPARCH؛ ۳. برآورد VaR برای هر دو موقعیت خرید و فروش.

سازمان‌دهی بخش‌های مختلف مطالعه به شرح زیر خواهد بود: نخست به مرور اجمالی پژوهش‌های مرتبط با مدل‌های به کار گرفته شده در تحقیق حاضر پرداخته می‌شود. سپس، الگوی مورد استفاده برای در نظر گرفتن چولگی و درجه آزادی متغیر با

-
1. Value-at-Risk
 2. time horizon
 3. Kraus & Litzenberger
 4. Harvey & Siddique
 5. Smith
 6. Fang & Lai
 7. Heston & Nandi
 8. Bates

زمان، مدل HYAPARCH و پیش‌بینی VaR خارج از نمونه معرفی می‌شود. سپس، توصیف آماری داده‌ها و ارزیابی عملکرد مدل‌ها بررسی می‌شود. در بخش پایانی نیز خلاصه نتایج این تحقیق و پیشنهادها ارائه می‌شود.

مروری بر پیشینهٔ پژوهش

هانسن^۱ (۱۹۹۴) نخستین فردی بود که یک مدل ARCH را برای درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان گسترش داد. او چولگی و درجهٔ آزادی شرطی توزیع α استیومن‌نلت چولهٔ تعمیم‌یافته را با اعمال یک ضابطه حرکت درجهٔ دوم (LOM) بر اطلاعات شرطی‌کننده مدل‌سازی کرد. پس از آن، هاروی و سیدیکیو (۱۹۹۹) و دیگران، با اعمال ضوابط حرکت جایگزین، این روند را گسترش دادند.

در دهه‌های اخیر شاهد ادبیات گستره‌های در زمینهٔ اثبات حافظهٔ بلندمدت^۳ در نوسانات بازار سهام، نرخ ارز و کالا نیز بوده‌ایم (مثل مطالعات بایلی^۴، ۱۹۹۶؛ اندرسون و بلرسلو^۵، ۱۹۹۷؛ الدر و جین^۶، ۲۰۰۷). از زمانی که بایلی و همکاران (۱۹۹۶) به معرفی فرایند FIGARCH^۷ پرداختند، تعدادی از مدل‌های نوسان‌پذیری حافظهٔ بلندمدت به منظور بروط‌ساختن محدودیت‌های مدل FIGARCH پیشنهاد شده است. مدل FIAPARCH تی سی^۸ (۱۹۹۸) فرایند FIGARCH را به منظور درنظرگرفتن عدم تقارن^۹ و فراهم‌ساختن امکان مشخص‌سازی توان معادلهٔ ناهمسانی توسط داده‌ها گسترش داد. فرایند HYGARCH دیویدسن^{۱۰} (۲۰۰۴) محدودیت واریانس غیرشرطی بی‌نهایت را بروط‌ساخت و فرایند HYAPARCH^{۱۱} دیونگ یو و گیوگان^{۱۲} (۲۰۰۷) این دو مدل را ترکیب

1. Hansen
2. Quadratic Law of Motion
3. long memory
4. Baillie
5. Andersen & Bollerslev
6. Elder & Jin
7. Fractionally Integrated GARCH
8. Tse
9. asymmetry
10. Davidson
11. Hyperbolic Asymmetric Power ARCH
12. Diougue & Guegan

کرد و همه این محدودیتها را برطرف ساخت. دارک^۱ (۲۰۱۰) برای اولین بار ادبیات نوسان‌پذیری حافظه بلندمدت را با ادبیات گشتاورهای مراتب بالاتر متغیر با زمان ترکیب کرد. دارک مدل HYAPARCH را برای درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان در توزیع شرطی بسط داد. این فرایند توسط مدل‌سازی چولگی شرطی و درجات آزادی توزیع t استیوونت چوله لمبرت و لورنت^۲ (۲۰۰۱) به عنوان تابعی از اطلاعات شرطی‌کننده صورت می‌گیرد. ضوابط حرکت (LOM) پیشنهادشده در این مطالعه شامل رویکردهای اصلی در ادبیات، از جمله GARCH (مانند هاروی و سیدیکیو، ۱۹۹۹)، درجه دوم (مانند هانسن، ۱۹۹۴) و تصریحات خودرگرسیون (جاندیو و راکینجر، ۲۰۰۳) است. در این پژوهش، به جای تحمیل محدودیتها بر پویایی، مدل HYAPARCH ارائه شده با چولگی و درجات آزادی متغیر مدل‌سازی را تسهیل می‌کند. این پژوهش با بررسی پیش‌بینی‌های خارج از نمونه^۴ VaR با استفاده از مدل‌هایی با چولگی و درجات آزادی متغیر با زمان نشان می‌دهد با آنکه چولگی و کشیدگی در توزیع شرطی به بهبود عملکرد مدل در دوره داخل نمونه منجر شده است، تخمین‌های خارج از نمونه VaR به طور کلی کاربرد مدل‌هایی با چولگی و کشیدگی (ثابت یا متغیر با زمان) را در توزیع شرطی تأیید نمی‌کند و به هنگام برآورد VaR به طور کلی، چولگی و کشیدگی در توزیع بازده غیرشرطی از طریق مدل‌های واریانس شرطی نامتقارن با توزیع نرمال بهتر در نظر گرفته می‌شود.

از سوی دیگر، تحقیقات انجامشده در زمینه بررسی اهمیت درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان مختلط است؛ به گونه‌ای که برخی بیان می‌کنند درنظرگرفتن کشیدگی متغیر با استفاده از توزیع t استیوونت و بر مبنای ضابطه حرکت ED^۵ (گورمت و هریس، ۲۰۰۲) و چولگی و کشیدگی متغیر با استفاده از توزیع NIG^۶ و بر مبنای ضابطه حرکت GARCH (ویلهلمسن^۷، ۲۰۰۹) ممکن است به بهبود تخمین‌های VaR منجر شود.

-
1. Dark
 2. Lambert & Laurent
 3. Jondeau & Rockinger
 4. out of sample
 5. Exponential decay
 6. Guermat & Harris
 7. Normal Inverse Gaussian
 8. Wilhelmsen

با وجود این، پاره‌ای دیگر از تحقیقات از جمله مطالعه پریمرتني و برا^۱ (۲۰۰۱) یا راکینجر و جاندیو (۲۰۰۱) نشان‌دهنده آن است که چولگی و کشیدگی متغیر نیست یا درنظرگرفتن آن بهبود ناچیزی ایجاد خواهد کرد. جاندیو و راکینجر (۲۰۰۳) به کشیدگی و چولگی متغیر در داده‌های روزانه پنج شاخص سهام در کشورهای مختلف پس برده‌اند، اما در داده‌های هفتگی این مسئله را تأیید نکرده‌اند. سایر محققان (باند و پتل^۲، ۲۰۰۳؛ هانسن، ۱۹۹۴؛ هاروی و سیدکو، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰) نشانه‌هایی از گشتاورهای مراتب بالاتر متغیر با زمان در داده‌های هفتگی و ماهانه یافته‌اند؛ در صورتی که راکینجر و جاندیو (۲۰۰۱) این مسئله را تأیید نکرده‌اند.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در تحقیقات داخلی، تا کنون به مطالعه اثر چولگی و کشیدگی متغیر در برآورد VaR با استفاده از مدل‌های حافظه بلندمدت پرداخته نشده است. در زمینه بهکارگیری مدل‌های حافظه بلندمدت، کشاورز و صمدی (۱۳۸۸)، در مطالعه‌ای، به برآورد تلاطم بازدهی در بازار سهام تهران و مقایسه دقت روش‌ها در تخمین VaR با استفاده از مدل‌های خانواده FIGARCH پرداختند. نتایج نشان‌دهنده آن است که در سطح معناداری ۲/۵ درصد مدل FIGARCH بهترین عملکرد را در میان مدل‌های GARCH دارد. در تحقیق دیگری، اسلامی بیدگلی و همکاران (۱۳۹۲) عملکرد روش پارامتریک در پیش‌بینی مقادیر VaR را با استفاده از برخی مدل‌های خانواده حافظه بلندمدت مانند FIGARCH، HYGARCH و FIEGARCH استیویدنت t استیویدنت و t استیویدنت چوله در قیمت سبد نفتی اوپک بررسی کردند. نتایج نشان می‌دهد پیش‌بینی مقادیر VaR یک‌روزه و ده‌روزه با استفاده از توزیع چوله از دقت و عملکرد بیشتری برخوردار است و مدل FIEGARCH در پیش‌بینی VaR بهتر از سایر مدل‌ها عمل می‌کند.

مدل‌های مورد استفاده در تحقیق و برخی از مفاهیم

حافظه بلندمدت

حافظه بلندمدت ساختار همبستگی مقادیر یک سری زمانی را در فواصل زمانی طولانی‌مدت

1. Premaratne & Bera
2. Bond & Patel

توضیح می‌دهد. حافظه بلندمدت در یک سری زمانی بدین مفهوم است که میان داده‌های آن با فاصله زمانی طولانی همبستگی وجود دارد. به عبارت دیگر، حافظه بلندمدت در بازده دارایی‌ها نشان‌دهنده خودهمبستگی میان مشاهدات با فاصله زمانی طولانی است. این پدیده موجب وابستگی غیرخطی در گشتاور اول توزیع بازده می‌شود و در دینامیک سری زمانی پارامتری ایجاد می‌کند که قابل پیش‌بینی است. این پارامتر با عنوان پارامتر حافظه بلندمدت شناخته می‌شود. گفتنی است وجود این اثر حاکی از رد فرضیه کارایی ضعیف بازار است.

چولگی و درجه آزادی متغیر با زمان

با وجود موقیت مدل‌های نوسان‌پذیری نامتقارن با خطاهای نرمال شرطی، خطاهای باقی‌مانده استاندارد شده معمولاً از چولگی و کشیدگی اضافی^۱ برخوردارند. به منظور انطباق با این ویژگی، تعداد زیادی از توزیع‌های شرطی مانند توزیع t استیوونت (بلرسلو^۲، ۱۹۸۷)، نمایی تعمیم‌یافته (نلسون^۳، ۱۹۹۱)، t استیوونت چوله (بیترز^۴، ۲۰۰۰) و پایدار نامتقارن (لیو و برورسن^۵، ۱۹۹۵) به کار گرفته شده است.

با پیروی از الگوی هانسن (۱۹۹۴) $\sigma_t = z_t \sigma_t$ ، که در آن ϵ_t نشان‌دهنده خطاهای واریانس و z_t خطاهای باقی‌مانده استاندارد شده است و $v_t \sim SST(0, 1, z_t)$ نشان‌دهنده توزیع t استیوونت چوله، $\tilde{\epsilon}_t$ چولگی متغیر با زمان و v_t درجه آزادی متغیر با زمان است. هانسن ضابطه حرکت درجه دوم را به صورت معادله‌های ۱ و ۲ پیشنهاد می‌دهد:

$$\tilde{\epsilon}_t^* = \rho_1 + \rho_2 (\tilde{\epsilon}_{t-1}^*) + \rho_3 (\epsilon_{t-1}^*) \quad (1)$$

$$v_t^* = \lambda_1 + \lambda_2 (\tilde{\epsilon}_{t-1}^*) + \lambda_3 (\epsilon_{t-1}^*) \quad (2)$$

که در آن تبدیل نمایی، تخمین‌های چولگی ($\tilde{\epsilon}_t$) و درجه آزادی (v_t) را در حدود بالا و پایین تعریف شده مناسب محدود می‌کند. همچنین، تحقیقات اخیر ضابطه حرکت GARCH را پذیرفته است. در این راستا، هاروی و سیدیکیو (۱۹۹۹) چولگی متغیر با زمان را از طریق معادله ۳ مدل‌سازی کردند.

1. excess kurtosis and skewness

2. Bollerslev

3. Nelson

4. Peters

5. Liu & Brorsen

$$\sigma_t = \rho_1 + \rho_4 (\varepsilon_{t-1}) + \rho_5 (\varepsilon_{t-2}) \quad (3)$$

بنابراین، بر اساس مطالعه دارک (۲۰۱۰) در تحقیق حاضر ترکیبی از ضابطه حرکت درجه دوم و ضابطه GARCH به منظور مدل سازی گشتاورهای مراتب بالاتر در نظر گرفته شده است.

مدل HYAPARCH با چولگی و کشیدگی متغیر با زمان

فرایند HYAPARCH حافظه بلندمدت را نشان می دهد و مدل HYGARCH دیویدسن (۲۰۰۴) را به منظور درنظرگرفتن عدم تقارن توسط رویکرد ARCH نوان نامتقارن دینگ^۱ و همکاران (۱۹۹۳) بهبود می بخشد. بنابراین، مدل HYAPARCH حافظه بلندمدت و عدم تقارن در نوسان پذیری را نشان می دهد و همچنین واریانس های بینهایت را به مدل تحمیل نمی کند و اجزاء می دهد داده ها توان معادله ناهمسانی را مشخص کنند. مدل HYAPARCH(p,d,q) را می توان به صورت معادله ۴ تعریف کرد:

$$\sigma_t^\delta = \frac{\omega}{\beta(1)} + \left(1 - \frac{\phi(L) \left[1 + \zeta ((1-L)^d - 1) \right]}{\beta(L)} \right) (|\varepsilon_t| - \gamma \varepsilon_t)^\delta \quad (4)$$

که در آن $\sigma_t = z_t \sigma_t$ ، $E(z_t) = 0$ ، $Var(z_t) = 1$ ، $E(\varepsilon_t) = 0$ ، $(i.i.d)$ ، σ_t تابعی مثبت، قابل اندازه گیری و متغیر با زمان از مجموعه اطلاعات در زمان $t-1$ است و $\beta(L) = 1 - \beta L - \beta^2 L^2 - \dots - \beta^d L^d > 0$ ، $\zeta > 0$ ، $d < 1$ ، $\omega > 0$ ، $\gamma < 1$ و $\phi(L) = 1 - \phi L - \phi^2 L^2 - \dots - \phi^d L^d$ ؛ به طوری که همه ریشه های (L) و $\phi(L)$ برای قرار گرفتن در خارج از دایره واحد محدود می شوند. هنگامی که $\gamma > 0$ ، شکهای منفی به نوسان پذیری بیشتر نسبت به شکهای مثبت منجر می شود. و اگر $\gamma < 0$ ، بر عکس فرایند HYAPARCH (1,d,1) با چولگی و درجه آزادی متغیر با زمان و معادله میانگین از نوع AR(1) به صورت معادله های ۵ و ۶ تعریف می شود:

$$r_t = \alpha_0 + \alpha_1 r_{t-1} + \varepsilon_t \quad (5)$$

1. Ding

$$\sigma_t^\delta = \frac{\omega}{1-\beta} + \left(\frac{(1-\phi L) \left[1 + \zeta \left((1-L)^d - 1 \right) \right]}{1-\beta L} \right) \left(|\varepsilon_t| - \gamma \varepsilon_t \right)^\delta \quad (6)$$

$$z_t \sim SST(\cdot, 1, \xi_t, v_t)$$

$$\xi_t^* = f_{\xi^*, t-1}(\cdot) \quad (7)$$

$$v_t^* = f_{v^*, t-1}(\cdot) \quad (8)$$

که f_{t-1} نشان‌دهنده تابعی از مجموعه اطلاعات تا زمان $t-1$ است.

جدول ۱. محدودیت‌های لازم برای تبدیل مدل HYAPARCH به سایر مدل‌ها

مدل‌ها	محدودیت‌ها
HYAPARCH	$\delta = 2, \gamma = 0$
FIAPARCH	$\zeta = 1$
FIGARCH	$\delta = 2, \gamma = 0, \zeta = 1$
APARCH	$d = 1, \zeta < 1, \gamma = 0, \delta = 0$
GARCH	$d = 1, \zeta < 1, \delta = 2, \gamma = 0$
IGARCH	$\zeta = 0 (d = 0), \delta = 2, \gamma = 0$

در حقیقت، مدل FIGARCH، FIAPARCH و HYGARCH مدل‌های HYAPARCH GARCH (بلرسلو، ۱۹۸۶)، APARCH (دینگ و همکاران، ۱۹۹۳) را در خود جای داده است. بنابراین، این مدل متداول‌تری مدل‌سازی را با تعمیم‌دادن تسهیل می‌کند. جدول ۱ محدودیت‌های لازم برای تبدیل مدل مذکور به سایر مدل‌ها را نشان می‌دهد.

معادله واریانس ناهمسانی با استفاده از فرایند QMLE در تحقیق بایلی و همکاران (۱۹۹۶) با وقفه برشی ۱۰۰۰ مشاهده تخمین زده می‌شود و توزیع t استیومنت چوله، که

1. Engle & Bollerslev

لامبرت و لورنت (۲۰۰۱) آن را معرفی کرده‌اند، به منظور درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی به کار گرفته شده است. در این صورت،تابع درستنمایی به صورت $L_t = \sum_{t=1}^T l_t$ است و

$$l_t = \ln\left(\frac{2}{\xi_t + \xi_t^{-1}}\right) + \ln\Gamma\left(\frac{v_t + 1}{2}\right) - \cdot / 5\ln[\pi(v_t - 2)] - \ln\Gamma\left(\frac{v_t}{2}\right) + \ln\left(\frac{s_t}{\sigma_t}\right) - \cdot / 5(1 + v_t)\ln\left[1 + \frac{(s_t z_{t+1} m_t)^{\frac{1}{2}} \xi_t^{-r I_t}}{v_t - 2}\right] \quad (9)$$

$$v_t > 2, \xi_t > 0$$

$$I_t = \begin{cases} 1 & \text{if } z_t \geq -\frac{m_t}{s_t} \\ -1 & \text{if } z_t < -\frac{m_t}{s_t} \end{cases} \quad (10)$$

که در آن T تعداد مشاهدات است، Γ تابع گاما است و m_t و s_t به ترتیب میانگین و انحراف معیار توزیع در زمان t هستند و به صورت معادله‌های ۱۱ و ۱۲ نمایش داده می‌شوند:

$$m_t(\xi_t, v_t) = \frac{\Gamma\left(\frac{v_t - 1}{2}\right)}{\sqrt{\pi}\Gamma\left(\frac{v_t}{2}\right)} \sqrt{v_t - 2} \left(\xi_t - \frac{1}{\xi_t}\right) \quad (11)$$

$$s_t(\xi_t, v_t) = \left(\xi_t^2 + \frac{1}{\xi_t^2} - 1\right) - m_t^2 \quad (12)$$

ξ_t نسبت حجم احتمال بالا و پایین مد است، بنابراین، ξ_t می‌تواند مقیاسی از چولگی در زمان t در نظر گرفته شود. ξ_t نشان‌دهنده اندازه چولگی تخمین‌زده شده است؛ به طوری که اگر $(< 0, > 0)$ ، چولگی توزیع به راست (چپ) است. هنگامی که t توزیع مورد نظر معادل توزیع t استیوونت است و هنگامی که $v_t \rightarrow \infty$ توزیع t استیوونت به توزیع نرمال نزدیک می‌شود و با مقادیری بیشتر از ۳۰ توزیعی تقریباً نرمال ایجاد خواهد شد (دارک، ۲۰۱۰). بایلی و همکاران (۱۹۹۶) نشان دادند تخمین ^۱QML مدل FIGARCH با فرض نرمالیتی شرطی برآوردهای نرمال مجذبی و پایدار را، حتی با وجود نقض فرض نرمالیتی، ایجاد خواهند کرد.

1. Quasi Maximum Likelihood

پیش‌بینی خارج از نمونه VaR

پیش‌بینی‌های VaR شرطی برای یک روز بعد بر اساس اطلاعات در زمان t به صورت $VaR_{t+1/t} = F_\alpha \sigma_{t+1/t}$ محاسبه شده است که در آن F_α صدک^۱ متناظر است (به منظور محاسبه VaR برای موقعیت فروش نیز همین تعریف برای دنباله راستتابع توزیع استفاده شده است، یعنی $\alpha - 1$ جایگزین α شده است). برای توزیع t استیودنت چوله، لامبرت و لورنت (۲۰۰۱) نشان دادند که F_α برابر است با:

$$F_\alpha = \begin{cases} \frac{\xi^{-\alpha} G\left(\frac{\alpha}{2}(1+\xi)\right) - m}{s} & \text{if } \alpha < \frac{1}{1+\xi} \\ \frac{-\xi G\left(\frac{1-\alpha}{2}(1+\xi)\right) - m}{s} & \text{if } \alpha \geq \frac{1}{1+\xi} \end{cases} \quad (13)$$

که در آن G تابع صدک توزیع است و m و s میانگین و انحراف معیار توزیع است (معادله‌های ۱۱ و ۱۲). در مدل‌هایی با چولگی و درجه آزادی متغیر m و s و ξ با پیش‌بینی‌های یک روز بعدشان جایگزین می‌شود. در تحقیق حاضر، برآوردهای ۹۹ VaR و ۹۵ درصد برای موقعیت‌های خرید و فروش (صدک‌های ۱، ۵ و ۹۵ درصد) پیش‌بینی شده است. همچنان، با استفاده از آزمون‌های کوپیک^۲ (پوشش غیرشرطی) (۱۹۹۵) و کریستوفرسن^۳ (پوشش شرطی) (۱۹۹۸) انطباق فراوانی مشاهده شده شکست‌ها در مدل تخمین‌زده شده با احتمال شکست مفروض و استقلال شکست‌ها بررسی شده است. بنابراین، فرض مقابل و فرض صفر در آزمون کوپیک (۱۹۹۵) به صورت $H_0: E/N = \alpha$ ، $H_1: E/N \neq \alpha$ است؛ که در آن E تعداد روزهایی است که زیان‌ها بیشتر از برآورد VaR هستند و N تعداد روزها در دوره پیش‌بینی است. آماره این آزمون به صورت معادله ۱۴ است:

$$LR = -2 \ln \left[(1-\alpha)^{N-E} \alpha^E \right] + 2 \ln \left\{ \left[1 - \left(E/N \right) \right]^{N-E} \left(E/N \right)^E \right\} \quad (14)$$

که دارای توزیع $\chi^2_{(1)}$ است (آزمون کریستوفرسن (۱۹۹۸) نیز مشابه است، با این تفاوت که استقلال شکست‌ها را نیز می‌سنجد).

-
1. Quantile
 2. Kupiec
 3. Christoffersen

در تحقیق حاضر برای مقایسه عملکرد مدل‌ها، علاوه بر الگوی شناخته شده کریستوفرسن (۱۹۹۸)، از تابع زیان و معیار هزینه فرصت نیز استفاده می‌شود. تابع زیان به منظور بررسی بزرگی شکست‌ها از VaR برآورده شده به کار گرفته شده است و به صورت معادله ۱۵ تعریف می‌شود:

$$C_t = \begin{cases} (r_t - VaR_t)^+ & \text{if } r_t \leq VaR_t \\ 0 & \text{if } r_t > VaR_t \end{cases} \quad (15)$$

برای مقایسه هزینه فرصت مدل‌ها نیز با استفاده از تابع زیر به مدل‌ها امتیاز داده شده است (برای موقعیت فروش علامت‌های نامساوی در معادله‌های ۱۵ و ۱۶ به صورت معکوس در نظر گرفته می‌شود):

$$E_t = \begin{cases} |r_t - VaR_t| & \text{if } r_t > VaR_t \\ 0 & \text{if } r_t \leq VaR_t \end{cases} \quad (16)$$

که در آن r_t نشان‌دهنده بازده و VaR_t پیش‌بینی VaR متناظر است. پس از محاسبه E_t و C_t برای دوره خارج از نمونه میانگین این مقادیر با یکدیگر جمع شده است و بدیهی است که هر چه مجموع این دو معیار (\bar{S}) کوچک‌تر باشد، مدل مورد نظر از هزینه فرصت کمتری برخوردار خواهد بود و اندازه شکست‌ها در آن کوچک‌تر است.

برآورد تجربی و ارزیابی عملکرد مدل‌ها در تخمین VaR

توصیف آماری داده‌ها

داده‌های تحقیق شامل ۵۰۲۹ داده روزانه از تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۰ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ مربوط به شاخص TEPIX است. بازدهی روزانه به صورت بازده مرکب پیوسته محاسبه شده است. ۲۵۲۹ مشاهده اول (تا تاریخ ۱۳۸۲/۸/۱۱) به منظور تخمین و ۲۵۰۰ مشاهده باقی‌مانده برای پیش‌بینی خارج از نمونه استفاده شده است. جدول ۲ ویژگی‌های آماری سری زمانی شاخص مورد نظر را نمایش می‌دهد. همان طور که ملاحظه می‌شود، میانگین بازده کوچک و چولگی معنادار و مثبت است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده اثر اهرم مالی^۱ در داده‌ها باشد. معیار کشیدگی نیز نشان‌دهنده کشیدگی بیشتر نسبت به توزیع نرمال است و پهن

1. leverage effect

دنباله‌بودن^۱ تابع توزیع احتمال تجربی شاخص مورد نظر را نشان می‌دهد. این ویژگی لزوم استفاده از توزیع پهن دنباله یا چوله پهن دنباله، مانند توزیع t استیوونت یا توزیع t استیوونت چوله، را برای توصیف توزیع شرطی بازده‌ها پیشنهاد می‌دهد.

آماره آزمون جارک^۲ برابر ۲۳۶۴۴ است. بنابراین، فرض صفر مبنی بر نرمال‌بودن توزیع بازده رد می‌شود. مقدار آماره باکس-یونگ^۳ برای بازده و مربع بازده با ده و دوازده وقفه از کوانتایل بحرانی چهارمین ده در سطح معناداری ۵ درصد بیشتر است و فرضیه صفر مبنی بر نویفه سفید^۴ بودن بازدهی و مربع آن رد می‌شود.

جدول ۲. ویژگی‌های سری زمانی بازده TEPIX در بازه زمانی ۱۳۷۱/۱۰/۲۸ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۸

شاخص	نتایج آزمون‌ها	شاخص	نتایج آزمون‌ها	ویژگی‌ها
۲۲۶۴۴	آماره جارک-برا	۵۰۲۹	تعداد مشاهدات	
-۴۷	ADF	۰,۱۰۳۱	میانگین	
-۴۷	آماره	۵,۲۶۰۸	ماکریمم	
۳۰۴۶۴	آماره آزمون: ARCH(۱۰)	-۵,۴۵۰۳	مینیمم	
مربع بازده	بازده	۰,۵۶۵۶	انحراف معیار	
۵۹۳/۱۳	آماره (۱۰)-آزمون Q-stat	۰,۴۳۷۰	چولگی	
۶۸۳,۸۹	آماره (۱۲)-آزمون Q-stat	۱۳۵۹	کشیدگی	

ADF نشان‌دهنده آماره دیکی-فولر، PP فیلیپس پرون، Q-stat(q) نشان‌دهنده آماره باکس-یونگ تعديل شده (B-L) است.

جدول ۳. نتایج بررسی آزمون‌های حافظه بلندمدت

مربع بازده	بازده	نتایج آزمون‌ها	(R/S) Lo(۱۰) آماره آزمون
۳,۲۹	۲,۵۹۶		(R/S) Lo(۱۰) آماره آزمون
GPH آزمون	d ۰,۲۶	p-value .	
	d ۰,۱۷	p-value .	

R/S آماره Lo و d پارامتر حافظه بلندمدت است.

1. fat-tailed
2. Jerque-Bra Test
3. Box-Ljung
4. white noise

مقدار آماره آزمون انگل (1982) با ده وقفه ۳۰۴,۶۴ از مقدار بحرانی تابع نمونه‌ای کای دو در سطح معناداری ۵ درصد بیشتر است و فرضیه صفر نبود ناهمسانی شرطی رد می‌شود. با توجه به آماره دیکی-فولر (ADF) فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد می‌شود و مانایی برقرار است. آماره آزمون PP یا آزمون فیلیپس پرون^۱ (1988) برابر ۴۷- است. در نتیجه، فرض صفر مبنی بر وجود ریشه واحد بار دیگر رد می‌شود.

آزمون‌های حافظه بلندمدت

به منظور بررسی وجود حافظه بلندمدت از آزمون‌های متدالو GPH، که گوک، پورتر و هوداک^۲ (1983) آن را ارائه کرده‌اند، و R/S لو^۳ (1991) استفاده شده است. جدول ۳ نتایج این دو آزمون را برای داده‌های مورد بررسی نمایش می‌دهد. در این آزمون‌ها فرضیه صفر نبود حافظه بلندمدت و فرضیه مقابله وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی است. با توجه به آماره آزمون R/S و مقدار p-value آزمون GPH فرض صفر با اطمینان بالا رد و وجود حافظه بلندمدت در بازده و نوسان بازده توسط هر دو آزمون تأیید می‌شود. همچنین، مقدار مثبت و کوچک‌تر از ۵۰ برای پارامتر حافظه بلندمدت (d) حاکی از مانایی سری زمانی مورد بررسی است.

برازش داخل نمونه‌ای مدل‌ها

مدل‌های HYAPARCH(1,1) و GARCH(1,1) با فرض توزیع نرمال (N)، استیویندنت چوله با چولگی و درجه آزادی ثابت (CS,CD) و متغیر با زمان (TVSD) تخمین زده شده است.^۴ جدول ۴ نشان‌دهنده پارامترهای برآوردشده معادله نوسان و معادلات چولگی و کشیدگی و آماره t برای هر یک از پارامترها در مدل‌های مفروض است (به منظور خلاصه‌سازی از ارائه کلیه پارامترهای معادلات نوسان و میانگین اجتناب شده است. این مقادیر در صورت نیاز قابل ارائه خواهد بود). همچنین، این جدول مقادیر دو معیار آکائیک^۵ (AIC) و شوارتز^۶ (SIC) را به منظور شناسایی مناسب‌ترین مدل‌ها نمایش می‌دهد.

1. Philips-Perron
2. Geweke, Porter & Hudak
3. Lo

4. کلیه تخمین‌ها با استفاده از نرم‌افزار Ox انجام شده است.

5. Akaike
6. Schwarz

جدول ۴. نتایج برآورد مدل‌ها

توزیع	مدل‌ها			GARCH		
	N	CS,CD	TVSD	N	CS,CD	TVSD
پارامترها و آماره t						
d/α	.۰۵۸ (۲,۵۰)	.۰۷۴ (۳,۱۷)	.۰۱۷ (۳,۳۲)	.۰۲۳ (۵,۸۲)	.۰۲۷ (۶,۶۹)	.۰۲۹ (۶,۹۳)
ζ/β	۱,۲۱ (۷,۵۲)	۱,۲۲ (۹,۷۵)	۲,۲۴ (۴,۰۸)	.۰۷۷ (۱۴,۸۵)	.۰۷۳ (۸,۴۰)	.۰۷۱ (۸,۵۷)
v	- (۲۴,۲۶)	۲,۲۵ 	- 	- (۲۳,۱۲)	۳,۲۳ 	-
ξ	- (۵۹,۷۶)	.۰۹۰۷ 	- 	- (۳۷,۳۱)	۱,۰۲ 	-
p ₁	- (-۴,۹۳)	- 	-۰,۷۷ (-۴,۹۳)	- 	- 	-۰,۶۵ (-۵,۱۴)
p ₃	- (۵,۰۶)	- 	.۰۳۹ (۵,۰۶)	- 	- 	.۰۳۵ (۴,۴۱)
p ₅	- (۰,۰۰۴)	- 	.۰۰۰۱ (۰,۰۰۴)	- 	- 	.۰۰۰۱ (۰,۰۰۶)
λ ₁	- (-۱۱,۰۳)	- 	-۴,۷۸ (-۱۱,۰۳)	- 	- 	-۳,۱۲ (-۲۶,۶۸)
λ ₂	- (۳,۹۸)	- 	.۰۶۷ (۳,۹۸)	- 	- 	.۰۱۰۵ (۱,۴۸)
λ ₃	- (-۳,۳۳)	- 	-۱ (-۳,۳۳)	- 	- 	-۰,۱۱ (-۱,۳۶)
AIC	.۰۶۹۱	.۰۲۹۳	.۰۲۸۷	.۰۷۲	.۰۳۶۲	.۰۳۵۴
SIC	.۰۷۱۲	.۰۳۱۹	.۰۲۲۱	.۰۷۳۲	.۰۳۷۸	.۰۳۸

علایم اختصاری برای هر یک از توزیع‌های شرطی عبارت‌اند از: N = چولگی ثابت، درجه آزادی ثابت (توزیع t استیوونت چوله) و TVSD = چولگی و درجه آزادی متغیر با زمان (توزیع t استیوونت چوله). معادله چولگی و کشیدگی متغیر به ترتیب به صورت $(\hat{\xi}_t^*) = p_1 + p_3(\varepsilon_{t-1}^*) + p_5(\varepsilon_{t-1}^2) + \lambda_1 + \lambda_2(\varepsilon_{t-1}^2) + \lambda_3(\varepsilon_{t-1}^3)$ است. آماره t در داخل پرانتز نمایش داده شده است و نمادهای AIC و SIC بدتر ترتیب نشان‌دهنده معیارهای آکائیک و شوارتز هستند.

با توجه به جدول ۴، معناداری پارامترها در اغلب مدل‌ها بهویژه در معادلات نوسان با کلیه فروض مربوط به توزیع بازدهی برای دو مدل GARCH و HYAPARCH مشاهده می‌شود. چولگی از طریق واریانس شرطی و توزیع شرطی در مدل‌ها در نظر گرفته شده است و نتایج برتری مدل‌های GARCH-CS,CD و HYAPARCH-CS,CD را بر حالت‌های معادل با توزیع نرمال تأیید می‌کند. به طور کلی، فرض تغییرپذیری چولگی و کشیدگی نسبت به حالت ثابت بهبود شایان ملاحظه‌ای در برآش مدل‌ها ایجاد نکرده است. این نتیجه با مطالعه راکینجر و جاندیو (۲۰۰۱) – که نشان می‌دهند درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر بهبود ناچیزی در تخمین‌ها ایجاد خواهد کرد – مطابقت دارد.

معناداری پارامتر d در مدل‌های HYAPARCH با فرض توزیع‌های متفاوت مؤید وجود حافظه بلندمدت در نوسان است. از سوی دیگر، با توجه به معیارهای AIC و SIC بهترین بهترین ترتیب مدل‌های HYAPARCH-TVSD و HYAPARCH-CS,CD است. HYAPARCH با کلیه فروض در مورد توزیع‌ها عملکرد برخوردارند و به کارگیری مدل HYAPARCH به بهبود برآش‌ها در مقایسه با مدل‌های GARCH معادل منجر شده است.

برآورد VaR خارج از نمونه

جدول ۵ مقادیر p-value آزمون کوپیک (۱۹۹۵) به همراه تعداد شکست‌های مشاهده شده و مجموع دو معیار تابع زیان و کارایی (\bar{S}) برای هر یک از مدل‌ها را نمایش می‌دهد (نتایج آزمون کریستوفرسن (۱۹۹۸) نیز مشابه است و در صورت نیاز قابل ارائه خواهد بود). با توجه به جدول ۵، تفاوت‌های فراوانی میان تعداد شکست‌های مشاهده شده برای موقعیت‌های خرید و فروش در مدل‌های متقارن (با توزیع نرمال) مشاهده می‌شود. مقادیر شکست‌ها برای موقعیت فروش در کلیه سطوح برای این مدل‌ها از موقعیت خرید بیشتر است. این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده فقدان تقارن در بازدهی‌ها باشد. این در حالی است که مدل‌های HYAPARCH و GARCH با درنظرگرفتن توزیع t استیوونت چوله (به صورت ثابت و متغیر) به نزدیک شدن مقادیر شکست برای موقعیت‌های خرید و فروش نسبت به حالت نرمال منجر شده است. مثلاً در یک مورد برای مدل N (HYAPARCH-N) GARCH-N با توزیع نرمال در سطح احتمال ۵ و ۹۵ درصد تعداد شکست‌ها در سمت چپ ۱۲۰ (۸۵) و در سمت راست ۲۱۳ (۱۵۷) مورد

است که اختلاف زیادی است. با وجود این، به کارگیری مدل GARCH و HYAPARCH با درنظر گرفتن توزیع t استیوونت چوله (به صورت ثابت و متغیر) این تفاوت را به گونه‌ای محسوس کاهش داده است. بنابراین، این مدل‌ها توانسته‌اند عدم تقارن در داده‌های مورد بررسی را به گونه‌ای مناسب در نظر بگیرند.

جدول ۵. نتایج اجرای آزمون‌های ارزیابی عملکرد برای شاخص TEPIX

VaR models	N_f	\bar{S}	$p\text{-values}$		N_f	\bar{S}	$p\text{-values}$	
			P_{un}	VaR 5%			P_{un}	VaR 95%
HYAPARCH								
N	۸۵	۰,۲۸۳۹	۰,۰۰۰۱		۱۵۷	۰,۳۳۶۱	۰,۰۰۴۶	
CS,CD	۱۳	۱,۱۵۵۶	<۰,۰۰۰۱		۱۰	۱,۱۳۷۰	<۰,۰۰۰۱	
TVSD	۱۷	۰,۹۸۱۸	<۰,۰۰۰۱		۶	۱,۳۱۳۱	<۰,۰۰۰۱	
GARCH								
N	۱۲۰	۰,۲۵۰۸	۰,۶۴۴۲		۲۱۳	۰,۳۰۰۰	۰,۰۰۰۰	
CS,CD	۶۲	۰,۳۵۷۷	<۰,۰۰۰۱		۸۷	۰,۴۵۸۱	۰,۰۰۰۲	
TVSD	۵۹	۰,۳۶۶۹	<۰,۰۰۰۱		۸۰	۰,۴۷۸۱	<۰,۰۰۰۱	
HYAPARCH								
N	۴۳	۰,۴۴۰۶	۰,۰۰۱		۴۹	۰,۵۳۹۳	<۰,۰۰۰۱	
CS,CD	۳	۲,۷۶۹۵	<۰,۰۰۰۱		۰	۲,۷۸۸۷	<۰,۰۰۰۱	
TVSD	۴	۲,۲۸۶۴	<۰,۰۰۰۱		۰	۲,۱۸۶۱	<۰,۰۰۰۱	
GARCH								
N	۵۳	۰,۳۸۸۶	<۰,۰۰۰۱		۷۸	۰,۴۷۱۸	<۰,۰۰۰۱	
CS,CD	۲۰	۰,۷۷۲۶	۰,۲۹۷۷		۱۲	۱,۰۴۶۰	۰,۰۰۳۶	
TVSD	۱۹	۰,۷۹۴۰	۰,۲۰۷۹		۹	۱,۱۰۳۳	۰,۰۰۰۲	

p-value‌ها برای آزمون پوشش غیرشرطی (P_{un}) همراه با تعداد شکست‌های مشاهده شده (N_f) در جدول نمایش داده شده است. نماد \bar{S} نیز نشان‌دهنده مجموع معیار بزرگی شکست‌ها و کارایی است.

با وجود این، مدل‌های HYAPARCH و GARCH با توزیع t استیوبدنت چوله (به صورت ثابت و متغیر) در همه سطوح احتمال (به جز در سطح احتمال ۱ درصد در مدل‌های GARCH-CS,CD و GARCH-TVSD) مقدار VaR را بیش از حد برآورد کرده‌اند؛ به گونه‌ای که میزان شکست تجربی بسیار کمتر از میزان مفروض مدل است. بنابراین، با توجه به مقادیر p -value و میزان شکست تجربی، این مدل‌ها (به جز در سطح احتمال ۱ درصد برای مدل GARCH) برآورده محافظه‌کارانه‌ای را ارائه می‌کنند. با توجه به ویژگی داده‌های مورد بررسی، اگرچه مدل‌های HYAPARCH-TVSD و HYAPARCH-CS,CD در دوره داخل نمونه از عملکرد مناسبی در مقایسه با سایر مدل‌ها برخوردارند، از لحاظ برآورده VaR در دوره خارج از نمونه مقادیر محافظه‌کارانه‌ای ارائه می‌دهند. این نتیجه با نتایج مطالعه دارک (۲۰۱۰) نیز در زمینه استفاده از این مدل‌ها با توزیع‌های t استیوبدنت چوله (به صورت ثابت و متغیر) مطابقت دارد. با وجود این، ویلهلمسن (۲۰۰۹) در مطالعه‌ای بر شاخص S&P500 بیان می‌کند چولگی و کشیدگی متغیر بر مبنای توزیع NIG تخمین‌های VaR را بهبود می‌بخشد. از سوی دیگر، نتایج تحقیق اسلامی بیدگلی و همکاران (۱۳۹۲) استفاده از الگوهای حافظه بلندمدت FIEGARCH با توزیع t استیوبدنت چوله (به صورت ثابت) را در بازده قیمت سبد نفتی اوپک- که برخلاف شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران محدودیتی بر آن اعمال نمی‌شود و از حد مجاز نوسان برخوردار نیست- در پیش‌بینی مقادیر VaR با استفاده از آزمون‌های کوپیک و صدک پویا تأیید می‌کند.

در توزیع نرمال نیز تقریباً در همه سطوح احتمال (به جز ۵ درصد) مقدار VaR کمتر از حد برآورده شده است و مقدار شکست‌ها بسیار بیشتر از حد مجاز است. بنابراین، با توجه به نتایج آزمون‌های ارزیابی عملکرد، مدل‌های GARCH-N و HYAPARCH-N با فرض توزیع نرمال از توانایی مطلوبی برای برآورده VaR به ویژه در سطوح احتمال نهایی با توجه به پهن دنباله‌بودن توزیع بازده‌ها برخوردار نیستند و به طور کلی دارای اعتبار آماری نیستند. درنظر گرفتن فرض توزیع t استیوبدنت چوله به بهبود عملکرد مدل GARCH-N در سطح احتمال ۱ و ۹۹ درصد نسبت به حالت نرمال منجر شده است.

در تحقیق حاضر مدل‌ها با استفاده از معیار \bar{S} نیز بررسی می‌شوند تا مشخص شود در صورت محاسبه سرمایه پشتیبان کدام یک از مدل‌ها اقتصادی‌تر عمل خواهند کرد. بررسی این معیار نشان‌دهنده آن است که مدل‌ها با فرض توزیع نرمال از کمترین مقدار برای این معیار در مقایسه با توزیع t استیودنت چوله (به صورت ثابت و متغیر) برخوردارند. بنابراین، مدل‌های مذکور در صورت محاسبه سرمایه پشتیبان، هزینه فرصت کمتری نیز برای بنگاه ایجاد خواهند کرد. با وجود این، با توجه به نتایج آزمون‌های ارزیابی عملکرد در مدل‌های نرمال تعداد شکست‌ها بیش از حد بوده و از این لحاظ این مدل‌ها بسیار ریسکی‌اند. از سوی دیگر، در مدل‌های GARCH و HYAPARCH با توزیع t استیودنت چوله (به صورت ثابت و متغیر) مقادیر VaR محافظه‌کارانه به افزایش معیار \bar{S} و افزایش هزینه فرصت این مدل‌ها منجر شده است.

نتیجه‌گیری

در تحقیق حاضر به بررسی اثر درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی به صورت متغیر با زمان بر برآورد VaR با استفاده از مدل‌های HYAPARCH و GARCH و داده‌های شاخص TEPIX برای موقعیت‌های خرید و فروش پرداخته شد. در مطالعه حاضر، علاوه بر مدل HYAPARCH، که امکان درنظرگرفتن عدم تقارن و حافظه بلندمدت را فراهم می‌کند، از مدل GARCH نیز با توزیع‌های مختلف به منظور مقایسه نتایج استفاده شد. بررسی نتایج برآورد شش مدل مفروض در دوره داخل نمونه نشان‌دهنده عملکرد مناسب مدل‌های HYAPARCH-CS,CD و HYAPARCH-TVSD است. با وجود این، فرض تغییرپذیری چولگی و کشیدگی نسبت به حالت ثابت بهبود قابل ملاحظه‌ای در برآش مدل‌ها ایجاد نکرده است. همچنین، با توجه به نزدیک شدن تعداد شکست‌ها به گونه‌ای شایان ملاحظه در موقعیت‌های خرید و فروش نسبت به حالت نرمال، مدل‌های HYAPARCH و GARCH با چولگی و کشیدگی متغیر و ثابت از توانایی مناسبی در درنظرگرفتن عدم تقارن داده‌ها برخوردارند. از آنجا که میزان شکست تجربی در این مدل‌ها کمتر از میزان مفروض است، این مدل‌ها معیارهای محافظه‌کارانه‌ای هستند که در عین حال به درنظرگرفتن عدم تقارن در داده‌های مورد بررسی به گونه‌ای مناسب قادرند و می‌توانند

برای سرمایه‌گذاران و نهادهای ریسک‌گریز مانند بانک‌های مرکزی، صندوق‌های بازنیستگی، وقفی یا ثروت ملی مورد توجه باشند.

از سوی دیگر، اگرچه مدل‌های GARCH و HYAPARCH با توزیع نرمال به لحاظ مقادیر کمتر معیار \bar{S} هزینه فرصت کمتری را متوجه نهادهای مالی می‌کنند، نتایج آزمون‌های ارزیابی عملکرد نشان‌دهنده آن است که این مدل‌ها تقریباً در همه سطوح احتمال مقدار VaR را کمتر از حد برآورد کرده‌اند و مقدار شکست‌ها بسیار بیشتر از حد مفروض است و گویای ریسکی‌بودن و عدم اعتبار آماری آن‌هاست.

مطالعه اثر درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان و حافظه بلندمدت در نوسان‌پذیری به منظور برآورد VaR چند دوره‌ای یا بررسی اثر چولگی و کشیدگی متغیر با زمان بر قیمت‌گذاری دارایی‌ها، انتخاب پرتفو و پوشش ریسک می‌تواند موضوع‌هایی برای تحقیقات آتی باشد.

منابع

۱. اسلامی بیدگلی غلامرضا و همکاران (۱۳۹۲). محاسبه ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل‌های حافظه بلندمدت گارچ، مطالعات اقتصاد انرژی، ۱، ۳۹ - ۱۹.
۲. کشاورز حداد غلامرضا و صمدی، باقر (۱۳۸۸). برآورد و پیش‌بینی تلاطم بازدهی در بازار سهام تهران و مقایسه دقت روش‌ها در تخمین ارزش در معرض خطر: کاربردی از مدل‌های خانواده FIGARCH، تحقیقات اقتصادی، ۸۶، ۱۹۳ - ۲۳۵.
۳. شاخص بازده نقدی و قیمت بورس سهام تهران، <http://www.irbourse.com>
4. Andersen, T. & Bollerslev, T. (1997). Intraday periodicity and volatility persistence in financial markets, Journal of Empirical Finance, 4, 115-158.
5. Baillie, R. (1996). Long memory processes and fractional integration in economics, Journal of Econometrics, 73, 5-59.

6. Baillie, R., Bollerslev, T. & Mikkelsen, H. (1996). Fractionally Integrated Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, *Journal of Econometrics*, 74, 3-30.
7. Bates, D. (1996). Jumps and Stochastic volatility: exchange rate processes implicit in Deutschemark options, *The Review of Financial Studies*, 9, 69-107.
8. Bollerslev, T. (1987). A Conditional Heteroscedastic Time Series Model for Speculative Prices and Rates of Return, *The Review of Economics and Statistics*, 69, 542-547.
9. Bond, S. & Patel, K. (2003). The Conditional Distribution of Real Estate Returns: Relating time variation in higher moments to downside risk measurement, *Journal of Real Estate Finance and Economics*, 26, 319-339.
10. Christoffersen, P. (1998). Evaluating Interval Forecasts, *International Economic Review*, 39, 841-862.
11. Dark, J. (2010). Estimation of Time Varying Skewness and Kurtosis with an Application to Value at Risk, *Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics*, 14(2).
12. Davidson, J. (2004). Moment and Memory Properties of Linear Conditional Heteroscedasticity Models, and a New Model, *Journal of Business and Economic Statistics*, 22, 16-29.
13. Ding, Z., Granger, C. & Engle, R. (1993). A Long Memory Property of Stock Market Returns and a New Model, *Journal of Empirical Finance*, 1, 83-106.
14. Diongue, A. & Guegan, D. (2007). The Stationary Seasonal Hyperbolic asymmetric power ARCH model, *Statistics and Probability Letters*, 77, 1158- 1164.
15. Elder, J. & Jin, H. (2007). Long memory in commodity futures volatility: A wavelet perspective, *The Journal of Futures Markets*, 27, 411-437.
16. Engle, R. & Bollerslev, T. (1986). Modelling the Persistence of Conditional Variances, *Econometric Reviews*, 5, 1-50.
17. Fang, H. & Lai, T. (1997). Co-kurtosis and capital asset pricing, *The Financial Review*, 32, 293-307.

- 18.Geweke, J. & Porter-Hudak, S. (1983). The estimation and application of long memory time series models, *Journal of Time Series Analysis*, 4, 221-38.
- 19.Guermat, C. & Harris, R. (2002). Forecasting value at risk allowing for time variation in the variance and kurtosis of portfolio returns, *International Journal of Forecasting* , 18, 409-419.
- 20.Hansen, B. (1994). Autoregressive Conditional Density Estimation, *International Economic Review*, 35, 705-730.
- 21.Harvey, C. & Siddique, A. (1999). Autoregressive Conditional Skewness, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 34, 465-487.
- 22.Harvey, C. & Siddique, A. (2000). Conditional skewness in Asset Pricing Tests, *The Journal of Finance*, 55, 1263-1295.
- 23.Heston, S. & Nandi, S. (2000). A closed-form GARCH option valuation model, *The Review of Financial Studies*, 13, 585-625.
- 24.Jondeau, E. & Rockinger, M. (2003). Conditional Volatility, Skewness, and Kurtosis: Existence, Persistence and Comovements, *Journal of Economic Dynamics and Control*, 27, 1699-1737.
- 25.Kraus, A. & Litzenberger, R. (1976). Skewness Preferences and the Valuation of Risk Assets, *Journal of Finance*, 31, 1085-1100.
- 26.Kupiec, P. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models, *Journal of Derivatives*, 3, 73-84.
- 27.Lambert, P. & Laurent, S. (2001). Modelling Financial Time Series Using GARCH-Type Models and a Skewed Student Density, Mimeo, Universite de Liege.
- 28.Liu, S. & Brorsen, B. (1995). Maximum Likelihood Estimation of a GARCH-STABLE Model, *Journal of Applied Econometrics*, 2, 273-285.
- 29.Lo, A. (1991). Long-term memory in stock market prices, *Econometrica*, 59, 1279-1313.
- 30.Nelson, D. (1991). Conditional heteroscedasticity in asset returns: A new approach, *Econometrica*, 59, 347-370.
- 31.Peters, J. (2001). Estimating and forecasting volatility of stock indices using asymmetric GARCH models and (Skewed) Student-t densities, Mimeo, University of Liege, Belgium.

- 32.Premaratne, G. & Bera, A. (2001). Modeling Asymmetry and Excess Kurtosis in Stock Return Data, Mimeo, University of Illinois.
- 33.Rockinger, M. & Jondeau, E. (2001). Entropy Densities, with an application to autoregressive conditional skewness and kurtosis, Journal of Econometrics, 106, 119-142.
- 34.Smith, D. (2003). Conditional Coskewness and Asset Pricing, Mimeo, Simon Fraser University.
- 35.Tse, Y. (1998). The Conditional Heteroscedasticity of the Yen-Dollar Exchange Rate, Journal of Applied Econometrics, 13, 49-55.
- 36.Wilhelmsson, A. (2009). Value at Risk with time varying variance, skewness and kurtosis – the NIG-ACD model, The Econometrics Journal, 12, 82-104.